

## BIJSLUITER

# Alfacaine 2% + Adrenaline Pro Inj.

oplossing voor injectie voor honden en katten

### 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Alfasan Nederland BV  
Kuipersweg 9  
3449 JA Woerden  
Nederland  
Tel: 0348416945  
Fax: 0348483676

### 2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Alfacaine 2% + Adrenaline Pro Inj., oplossing voor injectie voor honden en katten.  
Lidocainehydrochloride en Adrenaline

### 3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:

#### Werkzaam bestanddeel:

Lidocainehydrochloride	20 mg
Adrenaline (als adrenaline-tartraat)	10 mcg

#### Hulpstoffen:

Natriummetabisulfaat (E223)	1,0 mg
Methylparahydroxybenzoesuur (E218)	1,0 mg
Propylparahydroxybenzoesuur (E216)	0,1 mg

### 4. INDICATIES

Lokaal anestheticum bestemd voor oppervlakte-, infiltratie- en epiduraalanesthesie.

### 5. CONTRA-INDICATIES

Niet te gebruiken bij:

- hyperthyroidisme;
- hartgebreken;
- ventriculaire hyperexcitatie

### 6. BIJWERKINGEN

- Bij gebruik aan lichaamsuiteinden: vasoconstrictie wat necrose tot gevolg kan hebben;
- Cerebrovasculaire complicaties zoals angst, convulsies en tremoren.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

### 7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond en kat.

### 8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Parentaal, uitgezonderd intraveneus.

- oppervlakteanesthesie:

het omspuiten van de te behandelen plaats;

- infiltratieanesthesie:

zaadstrengen (in combinatie met zware sedatie of anesthesie):

reu: 1-2 ml injectievloeistof per zaadstreng;

kater: 0,5 ml injectievloeistof per zaadstreng;

huid en spieren:

1 ml injectievloeistof per 5 kg infiltratiepunt

(maximaal 12 mg lidocainehydrochloride per kg);

- epiduraalanesthetie:  
1-5 ml injectievloeistof per dier  
of 1 ml injectievloeistof per 5 kg  
of 1-1,5 ml injectievloeistof per 10 cm ruglengte

## **9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING**

Parentaal, uitgezonderd intraveneus.

## **10. WACHTTERMIJN**

Niet van toepassing.

## **11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN**

Bewaren in een koelkast bij 2-8°C.

Bewaar injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Aangebroken flacon: direct gebruiken, niet bewaren.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.:

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

## **12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN**

**Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient.**

In verband met sensibilisatie en mogelijke overgevoeligheidsreacties en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden.

**Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie.**

Ventriculaire hyperexcitatie veroorzaakt door bijvoorbeeld chloroform, halothaan, cyclopropan, digitalis, diuretica, kininen.

**Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)**

Overdosering kan leiden tot slaperigheid, hypotensie en convulsies.

**Onverenigbaarheden**

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

## **13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

## **14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN**

18 Oktober 2012

## **15. OVERIGE INFORMATIE**

15 x 50 ml flacons in polystyreen omverpakking.

12 x 100 ml flacons in polystyreen omverpakking.

6 x 250 ml flacons in polystyreen omverpakking.

REG NL 1475

**KANALISATIE**

UDD