

# Amoxicilline 100 INJ



Registratienummer:  
**REG NL 2275 / UDD**

## Voor welke dieren is dit product bedoeld



## Samenstelling

Per ml:  
amoxicilline 100 mg  
als amoxicilline trihydraat

## Wachttermijn

**Rund:** (orgaan)vlees: 28 dg; melk: 84 uur

**Varken:** (orgaan)vlees: 28 dg; IKB: 28 dg

## Indicaties

### Rund:

Behandeling van:

- luchtweginfecties veroorzaakt door *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Haemophilus* spp en *Streptococcus* spp;
- huidinfecties veroorzaakt door *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Haemophilus* spp, *Staphylococcus* spp en *Streptococcus* spp;
- infecties veroorzaakt door *Salmonella* spp.

### Varken:

Behandeling van:

- luchtweginfecties veroorzaakt door *Pasteurella* spp, *Haemophilus* spp en *Streptococcus suis*;
- infecties veroorzaakt door *Escherichia coli*;
- vlekziekte veroorzaakt door *Erysipelothrix rhusiopathiae*;
- M.M.A. syndroom.

### Hond:

Behandeling van:

- luchtweginfecties veroorzaakt door *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp, *Haemophilus* spp, *Escherichia coli* en *Proteus mirabilis*;
- urogenitaalinfecties veroorzaakt door *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp, *Escherichia coli* en *Proteus mirabilis*;
- maagdkanaalinfecties veroorzaakt door voor amoxicilline gevoelige pathogenen zoals *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* en *Proteus mirabilis* op geleide van een specifiek antibiogram;
- huidinfecties veroorzaakt door *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Escherichia coli* en *Pasteurella multocida*.

### Kat:

Behandeling van:

- luchtweginfecties veroorzaakt door *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Haemophilus* spp, *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp en *Proteus mirabilis*;
- urogenitaalinfecties veroorzaakt door *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Escherichia coli* en *Proteus mirabilis*;
- maagdkanaalinfecties veroorzaakt door voor amoxicilline gevoelige pathogenen zoals *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* en *Proteus mirabilis* op geleide van een specifiek antibiogram;
- huidinfecties veroorzaakt door *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Escherichia coli* en *Pasteurella multocida*.

## Overige details

---

- Verpakking

Flacon 100 ml

---

- Farmaceutische vorm

Suspensie voor injectie

---

- Dosering

**Rund:**

Intramusculair

10 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht, tweemaal daags), gedurende 3 dagen.

**Varken:**

Intramusculair

10 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht, tweemaal daags), gedurende 3 dagen.

**Hond:**

Intramusculair of subcutaan

10 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht, tweemaal daags), gedurende 3 dagen.

**Kat:**

Intramusculair of subcutaan

10 mg amoxicilline per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht, tweemaal daags), gedurende 3 dagen.

---

**• Contra-indicaties**

- gebruik bij infecties veroorzaakt door penicillinase producerende bacteriën;
- overgevoeligheid voor penicilline;
- ernstige nierfunctiestoornissen.

---

**• Bijwerkingen**

Geen bekend.

---

**• Bewaarcondities en houdbaarheid**

Bewaren beneden 25 °C.

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

In het donker bewaren.

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.

Houdbaarheid na aanpakken van de flacon: 6 maanden.

---

**• Registratiehouder**

Dopharma Research B.V.

## Waarschuwingen:

**Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren**

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in de gevoeligheid van bacteriën voor amoxicilline, worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Onoordeelkundig gebruik van het middel kan het aantal bacteriën dat resistent is tegen amoxicilline verhogen en kan daardoor de effectiviteit van behandeling met andere  $\beta$ -lactam antibiotica verminderen, als gevolg van kruisresistentie.

### **Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient**

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

### **Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg**

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

### **Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)**

Niet combineren met bacteriostatische antibiotica.

### **Overdosering**

Amoxicilline heeft een hoge therapeutische index. De normale dosering voor parenteraal gebruik is 10 mg/kg lichaamsgewicht, waar de LD50 in de meest gevoelige diersoort 2870 mg/kg lichaamsgewicht bedraagt na parenterale toediening.

### **Onverenigbaarheden**

Niet vermengen met een ander diergeneesmiddel.